

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM  
PENDANT L'ANNÉE 1936

(autres que celles signalées dans les listes précédentes<sup>1</sup>)

PAR A. GUILLAUMIN et E. MANGUIN

MONOCOTYLÉDONES

- Acampe multiflora* Lindl.  
*Æchmea fasciata* Brong. var. *discolor* Mez.  
*Aglaonema oblongifolium* Kunth var. — (*Mornay*, f. 221, 1935)  
[Guillaum. det.]<sup>2</sup>.  
*Albuca caudata* Jacq. — Afrique du Sud : Port-Elizabeth  
(*Humbert* f. 353, 1933, n° 148) [Guillaum. det.].  
*Albuca minor* L. — Afrique du Sud : Port-Elizabeth (*Humbert*,  
f. 353, 1933, n° 87).  
*Alocasia odora* C. Koch. — Annam : Cua Tung (*R. P. Cadière*,  
f. 138, 1935) [Guillaum. det.]<sup>3</sup>.  
*Alocasia Sanderiana* Bull.  
*Aloe* × *Borziana* Terr. f.  
*Aloe ciliaris* Haw. C'est l'espèce signalée en 1922 (*Bull. Mus.*,  
1922, p. 587) et en 1925 (*loc. cit.*, 1925, p. 471) sous le nom de *Aloe*  
*Mac Owanii*, les fleurs correspondent tout à fait à la figure de  
Berger (*Pflanzenreich*, IV, 38, III, II, p. 256, fig. 97 c. A. G.

1. Voir pour les listes précédentes le *Bulletin du Muséum* à partir de 1920.

2. Diffère du type de *A. oblongifolium* Kunth par les feuilles marquées de bandes blanc-argenté irrégulières le long des nervures, une bande plus large alternant avec une bande plus étroite.

A noter que la coupe transversale du pétiole au-dessus de la gaine est triangulaire-comprimée et non circulaire comme le montre la figure d'Engler (*Pflanzenreich* IV, 23 D<sup>c</sup>, fig. 4, C') et que le spadice dépasse légèrement la spathe. Se rapproche par la coupe de la partie supérieure du pétiole de *A. marantifolium* mais cette espèce a, d'après la figure d'Engler (*l. c.* f. 10 B.), la spathe plus ouverte.

La clef d'Engler (*l. c.* p. 12) dit que la feuille est sans taches, mais la description (p. 27), dit que la face supérieure présente le long des nervures des bandes claires irrégulières.

Faudrait-il réunir les deux espèces ?

A. G.

3. Cette espèce n'était connue en Indochine qu'au Tonkin. Le nom spécifique est bien choisi car le spadice dégage une agréable odeur vanillée.

A. G.

- Aloe eru* Berger var. *maculata* Hort.  
*Aloe* cfr. *heteracantha* Bak. — [Guillaum. det.]<sup>1</sup>.  
*Aloe madecassa* Perr. de la Bât. × ? [Guillaum. det.]<sup>1</sup>.  
*Aneilema acuminatum* R. Br.  
*Angræcum modestum* Hook, f.  
*Angræcum pertusum* Lindl.  
*Anthurium Scherzerianum* Schott var. *M<sup>me</sup> Dallière*.  
*Anthurium Schlechtendalii* Kunth.  
*Areca Catechu* L.  
*Asparagus falcatus* L.  
*Asparagus medeoloides* Thunb.  
*Aspidistra elatior* Bl.  
*Batemanianthus Colleyi* Lindl.  
*Bifrenaria Harrisonæ* Reichb. f.  
*Bilbergia* × *Krameri* Wittm. (*thyrsoides* × *speciosa*).  
× *Brassocattleya M<sup>me</sup> Charles Maron* Maron (*Brassia Digbyana* × *Cattleya Warscewiczii*).  
*Bulbine aloides* Willd.  
*Bulbine caulescens* L.  
*Calanthe* × *Bryan* Cookson var. *William Murray* Cookson  
(*vestita* var. *rubro-oculata* × *vestita* var. *Regnieri Williamsii*).  
*Cattleya Harrisoniana* Batem.  
*Cattleya Warneri* T. Moore.  
*Cirrhopetalum cæspitosum* Wall. ? — (*Rosenthal*, f. 33, 1936)  
[Guillaum. det.].  
*Cirrhopetalum gamosepalum* Griff.  
*Cirrhopetalum picturatum* Lodd.  
*Cælogyne asperata* Lindl.  
*Cælogyne fimbriata* Lindl.  
*Colocasia affinis* Schott.  
**Cotyledon transvaalensis** Guillaum. sp. nov. — Afrique du Sud :  
Transvaal (*Humbert*, f. 353, n<sup>os</sup> 48 et 118, 1933)<sup>2</sup>.  
*Crinum pedunculatum* R. Br. var. *australe* Don.  
*Curculigo latifolia* Dryand.  
*Cryptocoryne ciliata* Fisch.  
*Ctenanthe Oppenheimiana* K. Schum.  
*Cymbidium giganteum* Wall.  
*Cymbidium* × *M<sup>me</sup> Charles Maron* ! × *insigne* ? [(*eburneum*  
× *Lowianum*) × *Tracyanum* !] × *insigne* ?  
*Cymbidium* × *Pauwelsii* Pauwels (*insigne Sanderi* × *Lowianum*).  
*Cymbidium Tracyanum* Hort.  
*Cyperus laxus* Willem.

1. Voir plus loin p. 96, 97.

2. Voir *Bull. Mus.*, 1936, p. 363.

*Cypripedium* × *Alcibiades* Holford (× *Mr de Curte* × × *Leeanum*) = [(*Boxallii* × *insigne* var. *Chantinii*) × (*insigne* var. *Chantinii* × *Spicerianum*)].

*Cypripedium Charlesworthii* Rolfe.

*Cypripedium* × *decipiens* Duval (*Charlesworthii* × *Lawrenceanum*).

*Cypripedium* × *D<sup>r</sup> Clinge Doorenbos* Peeters (*Rothschildianum* × *Lawrenceanum*).

*Cypripedium* × *eboriacum* Craven (*insigne* × *nitens*).

*Cypripedium* × *Goulthenianum* Goulton var. *album* Vacherot et Lecoufle (*callosum* × var. *Sanderæ* × *Curtisii* var. *Sanderæ*).

*Dendrobium Bronckartii* De Wildm. — Indochine (*Delacour*, f. 200, 1930) [Guillaum. det.].

*Dendrobium delicatum* Bailey.

*Dendrobium densiflorum* Wall. — Indochine (*Delacour*, f. 200, 1930, n° 4) [Guillaum. det.].

*Dendrobium nobile* Lindl. var. *Cooksonianum* Reichb. f.

*Deuterocohnia longipetala* Mez.

*Dieffenbachia picta* Schott var. *typica* Engl. sub var. *Jenmannii* Engl. = *Dieffenbachia Jenmannii* Veitch.

*Duvalia elegans* Haw.

*Dyckia altissima* Lindl.

*E. difforme* Jacq. — Guadeloupe (*Lami* f. 102, 1936, n° 4) [Rodriguez det.].

*E. nocturnum* Jacq. — Guadeloupe (*Lami*, f. 178, 1936, n° 16) [Rodriguez det.].

*E. ramosum* Jacq. — Guadeloupe (*Lami*, f. 102, 1936, n° 1 et f. 178, 1936, n° 5, 9, 28) [Rodriguez det.].

*Epidendrum ciliare* L. — Guadeloupe (*Lami*, f. 181, 1936) [Rodriguez det.].

*Eria obesa* Lindl.

*Gasteria grandiperla* G. — (*Gossot*, f. 288, 1932)<sup>1</sup>.

*Gongora quinquenervis* Ruiz et Pav.

*Haworthia chloracantha* Haw.

*Haworthia glabrata* Bak. var. *concolor* Salm-Dyck.

*Heteranthera graminea* Vahl.

*Isochilus linearis* R. Br.

*Kæmpferia Galanga* L.

1. Je n'ai trouvé mention de cette plante sans description que dans GASTAUD (*Collection de plantes grasses du Jardin botanique de Monaco*, p. 67, 1921); G. est sans doute l'abréviation de Gastaud. Cette plante se rapproche de *G. brevifolia* Haw. mais s'en distingue surtout par les bractées nettement plus ongués que les pédicelles. Est probablement un des nombreux hybrides, issus de cette espèce, qui existe dans les jardins; a sans doute été obtenu par Gastaud. A. G.

- Lælia elegans* Reichb. f. [Guillaum. det.].  
× *Læliocattleya Princesse Ouroussoff* Marcoz (*Cattleya Dowiana*  
× *Læliocattleya Dumatii*).  
× *Læliocattleya Souvenir de l'Aviateur Pégoud* Marcoz<sup>1</sup>. (*Cat-*  
*tleya* × *Pittiana* O' Brien × *Læliocattleya Marguerite Fournier*  
Cogn.) = [(*Cattleya Dowiana* var. *aurea* × *Cattleya granulosa*) ×  
*Lælia Digbyana* × *Cattleya labiata*][Guillaum. det.].  
*Lasia spinosa* Thw.  
*Lindmannia penduliflora* Stapf.  
*Liparis distans* Clarke — (Marcoz, f. 118, 1921) [Guillaum.  
det.]<sup>2</sup>.  
*Luisia teretifolia* Gaud.  
*Lycaste consobrina* Reichb. f.  
*Masdevallia Veitchiana* Reichb. f.  
*Maxillaria setigera* Lindl.  
*Maxillaria variabilis* Batem. form. *angustifolia*.  
*Microstylis umbelliflora* Hitch. — Guadeloupe (*Lami*, f. 178,  
1936, n° 15) [Rodriguez det].  
*Miltonia* × *Bleuana* Bleu (*vexillaria* × *Roetzli*).  
*Musa Cavendishii* Lam.  
*Octomeria graminifolia* R. Br. — Guadeloupe (*Lami*, f. 102, 1936,  
n° 12 et f. 178, 1936, n° 2) [Rodriguez det.].  
*Odontoglossum grande* Lindl. — (Pacheco, f. 184, 1935, n° 2)  
[Guillaum. det.].  
*Oncidium flexuosum* Sims.  
*Ornithidium coccineum* Salisb. — Guadeloupe (*Lami*, f. 102,  
1936, f. 178, 1936, n° 19) [Rodriguez det.].  
*Nolina longifolia* Hemsl.  
*Ornithogalum hispidulum* Hornem. — Afrique du Sud : Port-  
Elizabeth. (*Humbert*, f. 353, 1933, n° 109).  
*Paphiopedilum hirsutissimum* Pfitz.  
*Paphiopedilum* × *superciliare* Stein (*superbiens* × *barbatum*).  
*Paphiopedilum tonsum* Pfitz. [Guillaum. det.].  
*Phalænopsis* × *Rothschildianum* Veitch (*amabilis* × *Schille-*  
*riana*) .  
*Peliosanthes violacea* Wall. var. *Clarkei* Bak.  
*Philodendron calophyllum* Brong.  
*Philodendron Wendlandii* Schott.  
*Pitcairnia Palmeri* S. Wats.

1. Marcoz a placé, je ne sais pourquoi, cette plante dans les *Brassocattleya*.

2. C'est la plante signalée antérieurement (*Bull. Mus.*, 1923, p. 472) sous le nom de *Liparis Manii* (*Lionet* f. 257, 1913; aurait été importé de Darjeeling suivant la fiche de *Lionet*. A. G.

*Pitcairnia* × *Wittei* Hort. Lugd. Bat. — (*Jardin botanique de Leyde*, f. 132, 1930) <sup>1</sup>.

*Pleurothallis ruscifolia* R. Br. — Guadeloupe (*Lami*, f. 178, n° 3, *pro parte*, n° 25, 1936) [Guillaum. det.] et Guadeloupe : Bains jaunes (*Lami*, f. 102, 1936, n° 2) [Rodriguez det.].

*Physosiphon carinatus* Lindl.

*Polystachya luteola* Hook. — Guadeloupe (*Lami*, f. 174, 1936, n° 1) [Rodriguez det.].

*Renanthera Storiei* Reichb. f. var. *philippinensis* Ames. — Philippines (provenant de l'Exposition coloniale donné par le Gouverneur général Olivier, f. 380, 1931) <sup>2</sup>.

*Rhodospatha picta* Nichols.

*Sanseveria Bequaertii* De Wildm. — Kenya Colony (*Humbert* f. 233, 1933, n° 2 et n° 6) [Guillaum. det.] <sup>3</sup>

*Sansevieria subtilis* N. E. Br. var. **lumensis** Guillaum. var. nov. Base ouest du Ruvenzori, vallée de la Lum (*Humbert*, f. 233, 1933, n° 3) <sup>3</sup>.

*Sarcanthus secundus* Griff.

*Schismatoglottis rupestris* Zoll. et Mor.

*Scilla lanceaefolia* Bak.

*Sparaxis tricolor* Ker-Gawl.

*Stanhopea oculata* Lindl.

*Stanhopea Wardii* Lindl. forme *alba* <sup>4</sup>.

*Stelis ophioglossoides* Sw. — Guadeloupe (*Lami* f. 178, 1936, n° 31) [Rodriguez det.].

*S. perpusilliflora* Cogn. — Guadeloupe (*Lami*, f. 178, 1936, n° 8) [Rodriguez det.].

*Stuednera discolor* Bull.

*Tillandsia anceps* Lodd.

*Urginea nigritiana* Bak. — Soudan (*Waterlot*, f. 279, 1935). [Pellegrin et Guillaum. det.].

*Vanda tricolor* Lindl. var. *insignis* Warner.

*Vanda tricolor* Lindl. var. *planilabris* Lindl. [Guillaum. det.].

*Vanilla planifolia* Andr.

## DICOTYLEDONES

*Acacia longifolia* Willd.

*Acacia ornata* R. Br.

1. Voir *Bull. Mus.*, 1936, p. 362.

2. Voir *Bull. Mus.*, 1936, p. 362.

3. Voir *Bull. Mus.*, 1936, p. 363.

4. Diffère du type par la fleur blanche sauf l'hypochyle jaune d'or avec, à l'intérieur, une bande brun rouge visible par transparence et formant extérieurement deux taches sur les côtés. A. G.

- Acacia Oxycedrus* Bieb.  
*Acalypha Wilkesiana* Müll.-Arg. var. *Macafeana* Hort.  
*Achimenes pulchella* Hitschc.  
*Acnistus parviflorus* Griseb.  
*Adenocarpus foliosus* DC.  
*Adromiscus clavifolius* Haw.  
*Aeginetia indica* L.  
*Aeonium caespitosum* Webb et Berth.  
*Aeonium Haworthii* Webb et Berth.  
*Aeonium urbicum* Webb et Berth. [Guillaum. det.].  
*Ariocarpus trigonus* K. Schum <sup>1</sup>.  
*Aztekium Ritteri* Bodek.  
*Begonia* × *Comte A. de Limenghe* Ed. Morr. (*coccinea* × *undulata*).  
*Begonia convolvulacea* A. DC.  
*Begonia pilifera* A. DC.  
*Begonia* × *Prince de Liège* Hort. Leod. (*Forgetiana* Hemsl. × *corallina* Carr.)  
*Begonia rubella* Buch.-Ham.  
*Bertolonia marmorata* Naud. var. *Lady Clar Amesley*.  
*Binghamia multangularis* Britton et Rose var. *inermis*. — Pérou (*H. Blossfeld*, donné par la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie, f. 203, 1936).  
*Bixa Orellana* L.  
*Bjilia cana* N. E. Br.  
*Corpuscularia Lehmannii* Schwant.  
*Boucerosia europaea* Caruel.  
*Brucea ferruginea* L'Hérit.  
*Bryophyllum uniflorum* Berger.  
*Cassia Sophera* L.  
*Cerbera Tanghin* Hook. — Madagascar (*Heim*, f. 74, 1935). [Danguy det.].  
*Ceropegia dichotoma* Haw.  
*Chasmatophyllum masculinum* Dint. et Schwant.  
*Cheiridopsis tuberculata* N. E. Br.  
*Coccoloba peltata* Schott.  
*Cotyledon maculata* Salm-Dyck.  
*Crassula acutifolia* Lam. ? — Afrique du Sud : Port-Élisabeth (*Humbert*, f. 327, 1933) [Guillaum. det.].  
*Crassula Cooperi* Regel.  
*Crassula dubia* Schönl. — Afrique du Sud : Port-Élisabeth. (*Humbert*, f. 327; 1933) [Guillaum. det.].

1. Britton et Rose identifient cette espèce avec *A. retusus* Scheidw. ce qui est certainement une erreur. A. G.

- Crassula lendornensis* Dinter.  
*Crassula perforata* L. f.  
*Crassula pyramidalis* L. f.  
*Dactyloopsis digitata* N. E. Br.  
*Delosperma robustum* L. Bolus.  
*Desmodium Scalpe* DC.  
*Dicyrta Warscewicziana* Regel.  
*Drosanthemum obliquum* Schwant.  
*Echeveria nuda* Bak.  
*Echeveria* × *scaphophylla* Hort. (*agavoides* × *linguaeifolia*).  
*Echinopsis aurea* Britt. et Rose.  
*Epiphyllum Ruckeri* Paxt.  
*Eranthemum sanguinolentum* Hort. ex Veitch.  
*Eucalyptus coriacea* A. Cunn.  
*Euphorbia antisiphilitica* Zucc. — Régions chaudes du Texas  
(donné par le D<sup>r</sup> Croizat, f. 389, 1932).  
*Euphorbia Bivonae* Steud.  
*Euphorbia polygona* Haw.  
*Faucaria Haagei* Tisch.  
*Faucaria Jamesii*. — (Gossot, f. 251, 1934).  
*Ficus cuspidata* Resimw. ex Bl.  
*Ficus parietalis* Bl.  
*Gesneria ehelonoides* H. B. et K.  
*Glottiphyllum longum* N. E. Br.  
*Gossypium arboreum* L.  
*Guettarda uruquensis* Cham. et Schecht.  
*Hibiscus eschizopetalus* Hook, f.  
*Holarrhena antidysenterica* Wall.  
*Kleinia Mandraliscae* Tineo.  
*Klugia zeylanica* Gardn.  
*Lampranthus curvifolius* N. F. Br.  
*Melaleuca decussata* R. Br.  
*Mesembryanthemum canaliculatum* Haw.  
*Monanthes polyphylla* Haw.  
*Mucuna pruriens* DC.  
*Naegelia zebrina* Regel.  
*Neomamillaria comptotricha* Britt. et Rose.  
*Neomamillaria elongata* Britt. et Rose, var. *tenuis* (Schum.)  
Hort.  
*Neomamillaria polyedra* Britt. et Rose.  
*Neomamillaria procera* Ehrenb.

- Neomamillaria prolifera* Britt. et Rose.  
*Opuntia Grosseiana* A. Web. ex Rol.-Goss. — (Roland-Gosselin, f. 309, 1904<sup>1</sup>).  
*Pachyphytum bracteosum* Link. Kl. et Otto.  
*Pelargonium moniliforme* E. Mey. — Afrique du Sud (Humbert, f. 353, 1933) [Humbert et Guillaum. det.]<sup>2</sup>.  
*Pilea Spruceana* Wedd.  
*Pilocarpus pennatifidus* Lem.  
*Psammophora modesta* Schwant.  
*Psychotria crassa* Benth. — Guadeloupe (Mission Allorge, f. 178, 1936).  
*Rechsteineria macropoda* (Sprague)<sup>3</sup>.  
*Rhipsalis Warmingiana* Schum. [Guillaum. det.]<sup>4</sup>.  
*Ruschia Peersii* L. Bolus.  
*Senecio junceus* Haw. — Afrique du Sud : Port-Élizabeth. (Humbert, f. 327, 1933) [Guillaum. det.].  
*Stapelia* × *cantabrigiensis* A. Berg. (*grandiflora* × ?)  
*Stapelia discolor* Tod.  
*Stapelia variegata* L. var. *planiflora* N. E. Br.  
*Stapelia variegata*. var. *rugosa* N. E. Br.  
*Stephanophysum longifolium* Pohl.  
*Symphandra pendula* DC.  
*Titanopsis calcarea* Schwant.  
*Titanopsis Schwantesii* Schw.  
*Triphasia trifolia* P. Wilson.

#### GYMNOSPERMES

*Callitris quadrivalvis* Vent.

1. Fleurs mesurant 6 cm, de diamètre, sépales rouge sombre, arrondis-tronqués, fortement marginés, pétales orangé-jaunâtre. Articles à aréoles sans aiguillons ou à 1-2 très courts. A. G.

2. Diffère du type par le tube du calice seulement 3 fois plus long que les lobes, les pétales plus courts et plus étroits (1,3 cm. × 0,25 cm.), tous uniformément blancs. A. G.

3. Je n'ai trouvé trace de ce nom que dans les catalogues du Jardin botanique de Stockholm (*Delect. Hort. bot. Berg.* 1927 et 1928, p. 11, 1932 et années suivantes, p. 13). A. G.

4. Plante signalée sous le nom de *R. lumbricoides* en 1922 (*Bull. Mus.*, p. 540.)